

## **ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ**

Ο Καταρροϊκός Πυρετός είναι νόσος ιογενής. Οφείλεται σε RNA ιό ο οποίος μεταδίδεται με κουνούπια του γένους *Culicoides*, που είναι μικροσκοπικά και λεπτά έντομα 1-3 mm.

### **ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ & ΠΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (*Culicoides spp*)**

Τα ενήλικα θηλυκά κουνούπια απομυζούν αίμα και **εναποθέτουν τα αυγά τους σε υγρό υπόστρωμα (σάπια φύλλα, λάσπη, κοπριά κ.ά.).**

Θεωρείται ότι τα έντομα προτιμούν να τρέφονται όταν τα ευαίσθητα ζώα ευρίσκονται σε ανοικτούς εξωτερικούς χώρους. **Η κοιλιακή χώρα, τα αυτιά, οι μηροί των ζώων αποτελούν τα μέρη προτιμήσεών τους.**

Τα κουνούπια (*Culicoides spp*) **κατά τη διάρκεια της ημέρας ζουν μέσα στο στάβλο, στις υγρές και σκοτεινές γωνιές του** ενώ δραστηριοποιούνται μετά την δύση του ήλιου και στον εξωτερικό χώρο.

Το ζεστό, ξηρό εξωτερικό περιβάλλον και ο δυνατός ήλιος τα απενεργοποιεί και τα εξουδετερώνει.

Τα ενήλικα κουνούπια παραμένουν στην περιοχή όπου γεννήθηκαν και μετακινούνται σε μία απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από αυτή. Παρόλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν παθητικά, με ρεύματα αέρα, σε μια απόσταση άνω των 100-300 χλμ.

### **ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ**

**Καλός αερισμός του στάβλου – χρήση σήτας στα παράθυρα.**

**Απομάκρυνση της στρωμνής από τον στάβλο.**

**Όλοι οι χώροι της εκτροφής (προαύλιοι και στεγασμένοι) καθαρίζονται τακτικά και κατόπιν καλύπτονται με στρώμα άνυδρου άσβεστου.** Τα μέρη του δαπέδου, που καλύπτονται από τσιμέντο ή μέταλλο ή ξύλινες κατασκευές, πλένονται με διάλυμα εγκεκριμένου απολυμαντικού [συνιστάται το υποχλωριώδες νάτριο (ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ) με χρήση μάσκας και γαντιών].

**Ψεκάζουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα, τηρώντας τις οδηγίες, τις επιφάνειες εντός των στάβλων, τις υγρές και σκοτεινές γωνιές του, τις στέγες, τα δάπεδα, τα παράθυρα κ.λπ.**

Προσοχή **δεν** ψεκάζουμε στον αέρα, ούτε και τις μεγάλες υδάτινες συλλογές στέρνες, ρυάκια κτλ

Καταλυτικής σημασίας είναι να πραγματοποιούνται ψεκασμοί στην λάσπη, γύρω από τις ποτίστρες

Ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται και **στις κοπροσωρούς ή σκέπασμά τους με άνυδρο άσβεστο.**

**Οι ψεκασμοί, για να είναι αποτελεσματικοί, πρέπει να επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά 10-20 ημέρες, και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την επιδημιολογική κατάσταση της νόσου θα πρέπει να συνεχιστούν και κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.**

**Σκέπασμα** των βαρελιών, κ.τλ. που περιέχουν νερό.

**Τοποθέτηση εντομοπαγίδων ταχείας θανάτωσης εντόμων.**

**Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών επί των ζώων. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.**